

令和3年3月29日

会員各位

鎌倉市医師会 会長 山口 泰  
公衆衛生担当理事 今井 一登

「コロナウイルス修飾ウリジン RNA ワクチン(SARS-CoV-2) (コミナティ筋注)の  
接種に伴うアナフィラキシーの発生について」の通知について

神奈川県医師会より、文書が届きましたのでお知らせいたします。  
お手数でもご確認ください。

【お問い合わせ先】

鎌倉市医師会新型コロナウイルスワクチン予防接種担当 広崎 繁雄  
電話：0467-22-1245 <mailto:kcma.yoboseshu@kcma.jp>

日本医師会常任理事

釜 菴 敏

城 守 国 斗

「コロナウイルス修飾ウリジン RNA ワクチン (SARS-CoV-2) (コミナティ筋注) の  
接種に伴うアナフィラキシーの発生について」の通知について

コロナウイルス修飾ウリジン RNA ワクチン (SARS-CoV-2) (コミナティ筋注) の接種状況及び副反応疑い報告事例については、厚生労働省ホームページ及び厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(合同部会)において検討され、国により安全性に関する情報提供が行われているところです。

今般、厚生労働省より、令和3年3月12日の合同部会の検討結果を踏まえ、留意事項について改めて周知する旨、各都道府県知事等宛別添の通知がなされ、本会にも周知方依頼がありましたのでご連絡申し上げます。留意事項の概要は下記の通りです。つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知のうえ、郡市区医師会等に対する周知方ご高配のほどよろしくお願い申し上げます。

記

1. 本剤の接種にあたっては、予診時に、アレルギー疾患の既往やアナフィラキシーを含む即時型のアレルギー反応の既往について適切に確認すること。
2. 本剤接種後少なくとも15分間は被接種者の状態を観察する必要があること。また、過去にアナフィラキシーを含む思うアレルギー症状を引き起こしたことがある者については、接種後30分程度、状態の観察をする必要があること。
3. 被接種者にアナフィラキシー等の副反応がみられた際、速やかに適切な処置を実施し、必要に応じて医療機関へ搬送するため、関係部局と連携し必要な体制を確保すること。