

令和4年1月12日

会員各位

鎌倉市医師会会長 山口 泰
公衆衛生担当理事 今井 一登

新型コロナウイルス感染症に係る
入院優先度判断スコア Ver. 3.1 の運用開始について

神奈川県医師会より通知が参りましたのでお知らせします。

神奈川県健康医療局医療危機対策本部室長
(公 印 省 略)

新型コロナウイルス感染症に係る「入院優先度判断スコアVer. 3.1」
の運用開始について (通知)

日頃から、本県の新型コロナウイルス感染症対策の推進に御理解と御協力を
いただき、厚く御礼申し上げます。

現在、県内でのワクチン2回接種者割合は80%を超えましたが、2回目の接種
から6ヶ月を経過した方は今後、増加していきます。

そのような中で、最新の知見により、2回目の接種から6ヶ月経過した場合、
重症化等を予防する効果が低下することが分かってきました。

これまで「ワクチン2回接種後14日以上経過」した患者は「-1」としており
ましたが、このたび標記スコアを改定し、今後は「ワクチン2回接種(接種後14
日以降6ヶ月まで)または3回接種」の患者を「-1」とします。

つきましては、令和4年1月4日から「入院優先度判断スコアVer. 3.1」の運
用を開始しますので、本日以後は、スコアVer3.1を御活用くださるようよろしく
お願いいたします。

【添付資料】

○入院優先度判断スコア (Ver. 3.1)

問合せ先

感染症対策グループ 村岡、小野

電 話 045-210-4791

入院優先度判断スコア Ver. 3.1

合計5点以上が入院優先度高い

療養開始時の判定（入院勧告）の目安としてスコア活用

判断項目	スコア
男性	1
75歳以上	3
65～74歳	2
37週以降妊婦	5
透析	5
基礎疾患因子1項目あたり	1～2
CT/単純X線にて肺炎像 (過去の線維化でない、スリガラ ス状陰影や浸潤影を指す)	3
最も病変がひどいスライスで 左右合計面積の25%未満	3
最も病変がひどいスライスで 左右合計面積の25%以上	6
判定日を含めて3日以上38℃以上の発熱を認める (CTなどの画像検査代用として肺炎の可能性)	2
安静時SpO ₂ 94 or 95%	2
安静時or室内歩行等の労作時にSpO ₂ 93%以下	6
重症感（横になれないほどの高度咳嗽、摂食・飲水量低下な ど）	2
無症状	-1
ワクチン2回接種(接種後14日以降6ヶ月まで)または3回接種	-1

ない項目（CT等）は0点とする

基礎疾患	スコア
糖尿病	2
慢性呼吸器疾患（気管支喘息含む）	2
現在治療が必要な重度の心血管疾患 (症状や心不全伴う冠動脈疾患、心筋症など)	2
高度慢性腎臓病（GFR30未満が目安）	2
肥満	2
≥BMI30	2
30>BMI≥25	1
治療中の悪性腫瘍 (手術、抗がん剤など治療期間を終えたものを除く)	2
免疫低下状態（ステロイド等の免疫抑制剤使用、臓器移 植後、血液・骨髄移植、HIV、原発性免疫不全等）	2
肝硬変	1

* 基礎疾患の程度に関して、正確な定量的判断は困難であることを前提に初期判断を尊重する。

・スコア以外に医師の入院判断は優先される
・療養が困難な家庭環境は入院適応